

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

n° 533. A.D.

ÉDITION DE LA STATION "NORD et PICARDIE"

(NORD - PAS-DE-CALAIS - SOMME - AISNE - OISE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX - B.P. 355 - 62005 ARRAS -

Tel 23.09.35

BULLETIN TECHNIQUE 10001  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

Rég. recettes Dir. Dép. Agric.

13, Grand-Place - 62022 ARRAS

C.C.P. LILLE 5701-50

ABONNEMENT ANNUEL

60 Francs

BULLETIN n° 127 du 5 Juillet 1978

## GRANDES CULTURES

### POMME DE TERRE

Mildiou : Les pluies que nous subissons presque journellement depuis le 21 Juin en toutes régions maintiennent en permanence des conditions très favorables à l'extension de la maladie. Des sorties de taches sont possibles à tous moments. La persistance des pluies prolonge encore les risques dans le temps alors que le temps plus frais les retarde quelque peu.

Comme nous le redoutions, la maladie a progressé de façon importante en fin Juin, au moins dans certaines régions telles le Santerre où déjà des foyers importants étaient notés et l'Artois. La progression de l'épidémie est plus limitée ailleurs.

Il semble que cette année les sources primaires d'infection constituées par les nombreuses repousses, déchets et surtout jardins non traités aient joué un rôle important dans la dissémination du mildiou, au moins dans certaines régions. D'autre part, là où une bonne protection a pu être assurée notamment pour les 12-14 Juin puis 21-22 Juin, la situation sanitaire est satisfaisante, mises à part quelques manifestations de mildiou sur tiges, difficiles à éviter en pratique.

Quoiqu'il en soit et compte tenu de la situation actuelle, de la pression de la maladie et des graves risques d'extension toujours possibles s'efforcer de maintenir une protection très soignée de l'ensemble des cultures de façon continue et plus spécialement dans les tous prochains jours où de nouvelles pluies aggraveront encore une situation parfois déjà préoccupante.

Il est recommandable en conditions difficiles d'augmenter les doses/ha de produit d'environ 1/3 ou de faire appel, le cas échéant, à des produits plus performants, de type Daconil par exemple, pour tenter d'enrayer la maladie en place.

Nous n'insisterons jamais assez sur la nécessité d'une pulvérisation de qualité, réalisée sous une pression au moins égale ou supérieure à 5 kg.

L'utilisation de produits cupriques ou organo-cupriques n'est à réserver que pour les tous derniers traitements et donc, dans l'immédiat aux seules cultures de plants appelées à être défanées prochainement.

### CEREALES

La floraison étant dans la plupart des cas dépassée toute intervention fongicide est inutile même si l'on note l'apparition tardive de rouille brune par exemple.

Les seuils de populations de pucerons restent très faibles 16 % d'épis colonisés dans le Valois sur des blés proches du stade grain laiteux, alors que les conditions climatiques sont peu favorables à leur prolifération. Pas d'intervention justifiée.

28

.../...

ARBORICULTURE FRUITIERE

TAVELURE DU POMMIER ET DU POIRIER

Seuls les vergers ayant des taches doivent être protégés jusqu'à la récolte.

OIDIUM DU POMMIER

Poursuivre la protection en espaçant les traitements (une application tous les 15 jours).

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Si la température moyenne journalière est comprise entre 15 et 18°C, les prochaines éclosions importantes auront lieu pour :

- les zones chaudes de l'Aisne, de l'Oise, de la Somme voisines de Laon-Rogécourt-Trumilly-Ham du 10 au 15 Juillet.
- les zones plus fraîches de ces mêmes régions telles que Passy-en-Valois Villers-Cotterêts entre le 15 et le 20 Juillet.
- Pour le Pas-de-Calais entre le 15 et le 20 Juillet également.
- Pour les zones urbaines du Nord du 10 au 15 Juillet.
- Pour les zones fraîches du Nord du 12 au 17 Juillet.

CAPUA

La protection doit être maintenue dans tous les vergers régulièrement victimes des attaques de ce ravageur.

C.P.P.A.P. n° 533 A.D.

L'Ingénieur d'Agronomie

D. CALLU